不同栽培条件对榆黄蘑生理特性及总黄酮含量的影响

巫桂芬¹, 梁剑柳^{1,2}, 韦桥旺¹

(1. 广西民族师范学院 广西崇左 532200; 2. 广西大学 南宁 530004)

摘要:为探讨不同栽培条件对榆黄蘑生理特性及总黄酮含量的影响,以榆黄蘑为材料,采用超声波辅助提取法对13种不同栽培条件下的榆黄蘑进行总黄酮提取,并用亚硝酸钠-硝酸铝显色法进行显色分析。结果表明,在510 nm处, $R^2=0.9959$,线性关系良好;在不同栽培条件下,榆黄蘑子实体均检测出黄酮类化合物;在不同光照处理中,自然光处理榆黄蘑总黄酮含量(w,后同)最高,为 $22.607\text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$,红光处理总黄酮含量最低,为 $14.667\text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$;在不同栽培料处理中,混合栽培料处理榆黄蘑总黄酮含量最高,为 $22.007\text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$,玉米芯处理含量最低,为 $17.663\text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$;在不同部位的总黄酮含量分析中,菌盖总黄酮含量最高,为 $25.154\text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$,菌座总黄酮含量最低,为 $13.918\text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$ 。不同栽培条件影响榆黄蘑的黄酮含量,且对其生理特性也有一定的影响,栽培条件直接或间接地影响体内黄酮的积累与转移。

关键词:榆黄蘑;生理特性;黄酮;超声波

中图分类号:S646.1¹⁴ 文献标志码:A 文章编号:1673-2871(2024)11-075-06

Effects of different cultivation conditions on physiological properties and total flavonoids content of *Pleurotus citrinopileatus*

WU Guifen¹, LIANG Jianliu^{1,2}, WEI Qiaowang¹

(1. Guangxi Minzu Normal University, Chongzuo 532200, Guangxi, China; 2. Guangxi University, Nanning 530004, Guangxi, China)

Abstract: In order to study the effect of different cultivation conditions on the physiological characteristics and total flavonoid content of *Pleurotus citrinopileatus*, the total flavonoid was extracted from 13 kinds of *P. citrinopileatus* under different cultivation conditions by ultrasonic-assisted extraction method, and the color analysis was carried out by sodium nitrite and aluminum nitrate. The results showed that the linear relationship was good at 510 nm ($R^2=0.9959$). Flavonoids were detected in the *P. citrinopileatus* under different cultivation conditions. In different light treatments, the total flavonoid content of natural light treatment was the highest ($22.607\text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$), while the red light treatment was the lowest ($14.667\text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$). Among different cultivation materials, the mixed cultivation material treatment had the highest total flavonoid content of $22.007\text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$, while the corn cobs treatment had the lowest of $17.663\text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$. In the analysis of total flavonoid content in different parts, the content of total flavonoid in the cap of *P. citrinopileatus* was the highest ($25.154\text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$), while the content of total flavonoid in the fungal seat was the lowest ($13.918\text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$). Different cultivation conditions had influence on the flavonoid content and physiological characteristics of *P. citrinopileatus*. Cultivation conditions directly or indirectly affected the accumulation and transfer of flavonoid in the body.

Key words: *Pleurotus citrinopileatus*; Physiological characteristics; Flavonoids; Ultrasound

榆黄蘑(*Pleurotus citrinopileatus*)又称金顶侧耳、玉皇蘑,菌盖呈漏斗形,直径2~10 cm,呈亮黄色,属担子菌亚门、层菌纲、伞菌目、侧耳科、侧耳属,富含多种营养物质,如蛋白质、氨基酸、矿物质

以及微量元素等,深受广大消费者的喜爱^[1-2]。榆黄蘑是珍贵的药食同源经济菌之一,具有多种生理、药理活性物质,黄酮是其主要的活性成分之一^[3-5]。黄酮类化合物是植物特有的次生代谢产物^[6]。目前

收稿日期:2024-07-06;修回日期:2024-09-05

基金项目:广西自然科学基金(2022GXNSFBA035524);崇左市科技计划项目(崇科20220618);广西民族师范学院服务地方专项(2022FW072)

作者简介:巫桂芬,女,助理研究员,研究方向为食用菌栽培与育种。E-mail:wuguifen9999@163.com

已知的黄酮类化合物超过1万种,根据结构的不同可以分为二氢黄酮、黄酮、异黄酮、黄酮醇、黄烷醇和花色素六大类^[7-9]。试验研究证实,黄酮具有抗氧化、抗炎症、抗动脉粥样硬化、免疫调节等广泛、优良的生物学效应^[10-12],同时具有改善血液循环和降低胆固醇的作用^[13-14]。因此,榆黄蘑黄酮的研究在药物开发和食品营养领域具有广泛的应用前景^[15-16]。

食用菌中含有较多的黄酮类物质,近年来,以食用菌为原料提取黄酮类化合物的研究成为营养学领域最重要、最具有意义的研究课题之一^[17],但榆黄蘑菌体内的黄酮类化合物研究较少。笔者采用超声波提取法,利用超声波的空化作用、机械作用和热效应,破坏细胞和细胞膜结构,从而提高细胞内容物通过细胞膜的穿透能力,促进黄酮类化合物的释放与溶出,采用硝酸铝-亚硝酸钠显色法和分光光度法^[18]对不同栽培条件下榆黄蘑子实体的总黄酮含量进行测定,以期为榆黄蘑的开发利用提供一定的参考依据。

1 材料与方法

1.1 材料

试验材料为山东省平邑县食用菌研究所提供的平顶8-31榆黄蘑,经组织分离纯化而来。

1.2 方法

试验于2021年7月至2022年6月在广西民族师范学院崇智楼进行。采用不同栽培条件对榆黄蘑进行处理,其中不同栽培料为混合栽培料、玉米芯、杂木屑、稻草;不同光照为自然光、白光、蓝光、紫光、红光、暗处理;不同子实体部位分别取菌盖、菌柄、菌座3个部位。

试验采用菌包袋栽培榆黄蘑,菌包长度为15 cm,单个菌包接种菌种面积16 cm²(4 cm×4 cm)。接种后,先避光培养,菌丝在暗环境培养至满袋后即可展开不同因素的试验。各处理的子实体全部采收作为黄酮含量分析的试验材料,将子实体表面杂质去除,放入烘箱(60 °C,6 h)烘干,每个处理试验材料分别粉碎混匀后密封保存备用。试验采用完全随机设计法,所有处理均设3次以上重复。

1.2.1 不同光照处理对榆黄蘑生理特性及总黄酮含量的影响 分别采用自然光、蓝光、紫光、白光、红光和暗处理进行榆黄蘑的出菇培养,栽培基质配方为50%杂木屑、40%玉米芯、8%玉米粉、2%石灰。每个

处理采用单独培养柜隔开,避免各试验组光照条件间相互干扰。

1.2.2 不同栽培料处理对榆黄蘑生理特性及总黄酮含量的影响 以混合栽培料、玉米芯、杂木屑、稻草4种配方探讨不同栽培料对榆黄蘑总黄酮含量的影响。4种配方处理如表1所示,各处理组的培养环境条件保持一致。

表1 榆黄蘑的不同栽培料处理

Table 1 Different culture materials of *Pleurotus citrinopileatus*

处理 Treatment	栽培基质配方 Culture medium formula
混合栽培料 Mixed culture material	50%杂木屑、40%玉米芯、8%玉米粉、2%石灰 50% Sawdust, 40% corn cobs, 8% corn meal, 2% lime
玉米芯 Corn cobs	98%玉米芯、2%石灰 98% Corn cobs, 2% lime
杂木屑 Sawdust	98%杂木屑、2%石灰 98% Sawdust, 2% lime
稻草 Straw	98%稻草、2%石灰 98% Straw, 2% lime

1.2.3 榆黄蘑子实体不同部位总黄酮含量比较分析 该试验的栽培基质配方为50%杂木屑、40%玉米芯、8%玉米粉、2%石灰。分别取成熟期榆黄蘑的菌盖、菌柄、菌座3个部位(图1)进行总黄酮含量提取和分析。

图1 榆黄蘑取样部位示意图

Fig. 1 Diagram of sampling site of *Pleurotus citrinopileatus*

1.2.4 菌丝生长指标计算 采用长度法每隔7 d标记1次菌丝长度并计算菌丝生长速率。

菌丝生长速率/(cm·d⁻¹)=菌丝平均长度(cm)/培养时间(d)^[19]。 (1)

菌丝生长指数:培养第15天测量菌落直径后,对菌丝长势进行评分。菌丝长势评分标准为:5分,菌丝长势浓密,均匀;4分,菌丝长势较浓密,较均匀;3分,菌丝长势较稀疏,均匀;2分,菌丝长势较稀疏,较均匀;1分,菌丝长势稀疏,不均匀。以此计

算菌丝的生长指数^[20-21]。

菌丝生长指数 = 菌落长势评分 × 菌丝生长速率。
(2)

1.2.5 芦丁标准液的配制及标准曲线制作 精确称取芦丁 10 mg, 加 60%乙醇溶液溶解, 定容至 50 mL, 即得芦丁标准液(0.20 mg·mL⁻¹)。参照龙华等^[22]的试验方法测标准曲线, 按照以下梯度准确吸取芦丁标准溶液 0、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50、3.00、3.50 mL 分别置于 10 mL 容量瓶中, 先加入 5% NaNO₂ 溶液 0.40 mL, 摇匀 6 min 后; 再加入 10% Al(NO₃)₃ 溶液 0.40 mL, 摇匀放置 6 min; 最后加 1 mol·mL⁻¹ NaOH 溶液 4.00 mL, 加入 60%乙醇定容至 10 mL, 摇匀放置 15 min。取少量待测液润洗比色皿 2 次, 倒入 2/3 的待测液, 擦拭比色皿周围的液体, 放入紫外分光光度计, 在 510 nm 处测定吸光值。

1.2.6 总黄酮提取液的制备 精确称取 1.00 g 干燥样品于 100 mL 锥形瓶内, 缓慢加入 60%乙醇 50 mL, 在超声提取功率 300 W、温度 60 °C、时间 40 min 条件下提取总黄酮。然后在 3000 r·m⁻¹ 条件下离心 15 min。离心结束后, 取出上清液并加入 60%乙醇溶液定容至 50 mL, 即得待测液。

1.2.7 总黄酮含量测定 精确移取黄酮提取液 1.00 mL 至 10 mL 容量瓶内, 加入 5%NaNO₂ 溶液 0.40 mL, 摇匀放置 6 min; 加入 10%的 Al(NO₃)₃ 溶液 0.40 mL, 摇匀放置 6 min; 最后加 1 mol·mL⁻¹ NaOH 溶液 4.00 mL, 用 60%乙醇定容至刻度, 摇匀后放置 15 min, 置于最大吸收波长 510 nm 处测定吸光度值, 以芦丁含量为 0 的处理为空白对照。总黄酮含量(w, 后同)测定计算公式如下:

$$w(\text{总黄酮})/(\text{mg}\cdot\text{g}^{-1})=(C\times N\times V)/m。 \quad (3)$$

式中: C 表示从标准曲线中计算所得到的总黄酮质量浓度(mg·mL⁻¹); N 表示所稀释的溶液倍数; V 表示提取液所定容的体积(mL); m 表示称取的样品质量(g)^[23-24]。

1.2.8 精密度和重复性试验 取芦丁标准溶液按照 1.2.5 进行标准曲线绘制, 榆黄蘑样品溶液按 1.2.6、1.2.7 的方法进行操作。两者均在 510 nm 下测吸光度值, 重复测定 5 次, 测定榆黄蘑样品总黄酮的含量, 计算相对标准偏差(RSD)^[25]。

$$\text{RSD}/\%=\text{S}/\bar{X}\times 100。 \quad (4)$$

式中: S 表示标准偏差; X 表示样品总黄酮含量的平均值。

1.3 显色稳定性试验

取榆黄蘑样品, 根据放置时间的延后, 按 1.2.6、1.2.7 样品溶液的测定条件, 将其显色后每间隔 10 min 测定 1 次吸光度值, 共测量 7 次, 分析总黄酮含量的变化情况。

1.4 数据处理

采用 Excel 2010 进行图表绘制及生长速率计算等, 采用 SPSS18.0 对榆黄蘑总黄酮含量进行多重比较, 分析样品间的显著性和相关性。

2 结果与分析

2.1 不同栽培条件对榆黄蘑生理特性的影响

从表 2 知, 榆黄蘑在 4 种栽培料中菌丝均可正常生长, 其中混合栽培料中的菌丝生长情况最好, 菌丝颜色浓白, 菌丝浓密均匀, 评分为 5 分; 在玉米芯栽培料上的菌丝生长情况最差, 菌丝颜色浅白色, 均匀度较稀疏, 评分仅为 2 分; 在稻草和杂木屑栽培料上的菌丝生长情况相近, 但稻草栽培料上菌丝颜色为浓白色, 杂木屑栽培料上菌丝为白色, 而密度和均匀度相同, 评分皆为 4 分。

2.2 不同栽培条件对榆黄蘑菌丝生长的影响

由图 2 可知, 4 种栽培料在 1~7 d 的生长期中菌丝生长指数均表现出快速生长的趋势, 到 8~14 d 时菌丝生长指数均表现出下降的趋势, 15~21 d 时玉米芯和杂木屑的菌丝生长指数逐步下降, 混合栽培料和稻草表现出上升趋势。其中, 榆黄蘑菌丝在

表 2 榆黄蘑菌丝在不同栽培料上的生长情况

Table 2 Growth of the *Pleurotus citrinopileatus* hyphae on different culture medias

栽培料 Culture media	菌丝颜色 Hypha color	密度 Density	均匀度 Uniformity	菌丝长势评分 Hyphae growth score
混合栽培料 Mixed culture material	浓白色 Thick white	+++++	均匀 Even	5
玉米芯 Corn cobs	浅白色 Light white	++	稀疏 Sparse	2
稻草 Straw	浓白色 Thick white	++++	较均匀 Slightly even	4
杂木屑 Sawdust	白色 White	++++	较均匀 Slightly even	4

注: +++++表示榆黄蘑菌丝极浓密; ++++表示菌丝浓密; ++表示菌丝稀疏。下同。

Note: +++++ means that the mycelium of *Pleurotus citrinopileatus* is extremely dense; ++++ indicates that the mycelium is dense; ++ indicates that the mycelium is sparse. The same below.

杂木屑中生长速率最快,在 1~7 d 时以 $1 \text{ cm} \cdot \text{d}^{-1}$ 的速度生长;在 8~14 d 时以 $0.75 \text{ cm} \cdot \text{d}^{-1}$ 的速度生长;在 15~21 d 时以 $0.69 \text{ cm} \cdot \text{d}^{-1}$ 的速度生长。榆黄磨菌丝在混合栽培料和稻草栽培料上的速度较为平稳;菌丝在玉米芯栽培料上的生长最缓慢。

图2 榆黄磨在不同栽培料上的菌丝生长指数

Fig. 2 Hypha growth index of *Pleurotus citrinopileatus* on different culture medias

2.3 标准曲线绘制与榆黄磨总黄酮含量测定

2.3.1 标准曲线绘制 以芦丁浓度(C)为横坐标,吸光度值为纵坐标绘制成标准曲线。结果如图3,得出标准曲线方程为: $y=0.0111x-0.0193$, $R^2=0.9959$,表明两者的线性关系良好。

图3 芦丁标准曲线

Fig. 3 Standard curve of rutin

表3 精密度重复性试验结果

Table 3 Experimental results of precision and reproducibility

项目 Project	芦丁吸光度 Rutin absorbance	w(总黄酮) Content of total flavonoids/($\text{mg} \cdot \text{g}^{-1}$)
1	0.285	21.258
2	0.311	20.360
3	0.305	22.607
4	0.322	21.258
5	0.291	22.157
平均值 Average	0.302	21.528
相对标准偏差 RSD Relative standard deviation/%	0.490	0.400

2.3.2 精密度和重复性试验结果分析 在 510 nm 处测芦丁吸光度,如表3所示。芦丁标准液平均吸光度为 0.302,相对标准偏差(RSD)为 0.490% ($n=5$),榆黄磨总黄酮均值为 $21.528 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$, RSD 为 0.400%。芦丁标准溶液与榆黄磨总黄酮含量的 RSD 均在 1% 以下,表明仪器精密度良好,该方法重复性好,条件合理。

2.3.3 显色稳定性试验结果 榆黄磨菌样 60 min 内总黄酮含量变化如图4所示。20~30 min 内榆黄磨总黄酮含量相差最小,为 $0.898 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$,相对平稳,此时段最适宜进行总黄酮含量的测定;其余阶段的榆黄磨总黄酮含量的差值均大于 20~30 min 阶段,波动较大,不适宜进行榆黄磨总黄酮含量的测定。在 0~60 min 内,榆黄磨总黄酮含量共下降 $16.180 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$,这可能是静止产生了沉淀效应。

图4 榆黄磨 60 min 内总黄酮含量变化

Fig. 4 Changes in total flavonoids content of *Pleurotus citrinopileatus* in 60 minutes

在配好样品 20~30 min 时,对样品的总黄酮含量进行测定,测得吸光度平均值为 0.028,样品平均

总黄酮含量为 $21.258 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$, $\text{RSD}=0.26\%$ ($n=7$), 样品相对标准偏差小于 5%。由此可以看出, 样品在测定 20~30 min 时显色较为稳定。

2.4 不同光照处理对榆黄蘑总黄酮含量的影响

不同光照处理的榆黄蘑总黄酮含量如图 5 所示, 6 种光处理的总黄酮含量均不相同, 自然光处理的榆黄蘑总黄酮含量最高, 为 $22.607 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$, 极显著高于除蓝光外的其他处理。6 种不同光照条件下榆黄蘑总黄酮含量的高低排序为: 自然光、蓝光、白光、紫光、暗处理和红光。

注: 不同大写字母表示各处理间在 0.01 水平存在极显著差异, 不同小写字母表示各处理间在 0.05 水平存在显著差异。下同。

Note: Different uppercase letters indicate extremely significant difference between different treatments at 0.01 level, and different lowercase letters mean significant difference between different treatments at 0.05 level. The same below.

图 5 不同光照处理对榆黄蘑总黄酮含量的影响
Fig. 5 Effects of light treatment on total flavonoids content of *Pleurotus citrinopileatus*

2.5 不同栽培料处理对榆黄蘑总黄酮含量的影响

不同栽培料处理榆黄蘑总黄酮含量的影响如图 6 所示, 4 种处理中总黄酮含量均不相同, 混合栽培料栽培出的榆黄蘑的总黄酮含量最高, 为 $22.007 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$, 其次为杂木屑处理, 二者显著高于玉米芯和稻草处理, 玉米芯处理的榆黄蘑总黄酮含量最低。

2.6 不同榆黄蘑部位的总黄酮含量

由图 7 可知, 不同部位的榆黄蘑总黄酮含量呈极显著差异, 菌盖的总黄酮含量最高, 为 $25.154 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$, 菌柄次之, 菌座最低。

3 讨论与结论

笔者采用超声波辅助提取, 紫外分光光度检

图 6 不同栽培料处理对榆黄蘑总黄酮含量的影响
Fig. 6 Effects of culture media on total flavonoids content of *Pleurotus citrinopileatus*

图 7 不同部位的榆黄蘑总黄酮含量分析
Fig. 7 Analysis of total flavonoids content of different sites of *Pleurotus citrinopileatus*

测, 并用亚硝酸钠-硝酸铝显色法进行分析。结果表明, 该方法的精密度高、重复性良好, 不同处理条件下榆黄蘑均检测出黄酮类化合物, 且总黄酮含量呈显著差异。

在不同光照处理中, 总黄酮含量由高到低依次为自然光、蓝光、白光、紫光、暗处理和红光。根据潘俊倩等^[20]的研究推测, 自然光总黄酮含量最高, 这可能是因为自然光包含更多有效光源, 如蓝光、紫光等短波段光, 利于总黄酮含量的积累, 而长波段光如红光则抑制黄酮积累, 与本研究的結果一致。

在不同栽培料处理中, 总黄酮含量由高到低依次为混合栽培料、杂木屑、稻草、玉米芯。其中混合栽培料处理的总黄酮含量最高, 这可能是因为混合栽培料中的多种复合营养成分促进榆黄蘑总黄酮

含量的积累;玉米芯栽培的榆黄蘑总黄酮含量最低,可能是玉米芯中的营养成分单一。玉米芯中的营养成分主要为碳源,不能满足榆黄蘑所需的营养成分需求,不利于榆黄蘑总黄酮含量的积累,所测总黄酮含量较低。因此在榆黄蘑栽培过程中应满足其生长及物质积累所需的营养成分,才能保证产品的品质。

榆黄蘑不同部位总黄酮含量由高到低依次为菌盖、菌柄、菌座。已知黄酮类物质的分布与器官、生长发育时期有关^[27],刘佳微等^[28]在研究贵茛1号不同部位总黄酮含量时推测其分布还与营养成分有关。其中榆黄蘑菌盖的总黄酮含量最高,这可能是其生长期及生长后期菌盖的代谢较菌柄和菌座旺盛。菌盖是产生孢子的部位,其次级代谢产物不断转移和积累在该部位。黄酮作为榆黄蘑的重要次级代谢产物,其含量也在菌盖中得到积累与呈现。菌座的总黄酮含量最低,可能是该部位只作为黄酮转运通道,不具备黄酮的“储存仓”,因此不利于榆黄蘑总黄酮的积累。

综上所述,在自然光(完全可见波长)培养条件下,养分越均衡越有利于榆黄蘑黄酮的积累。不同榆黄蘑部位的总黄酮合成或积累量不同,其中菌盖的含量最高。了解榆黄蘑体内黄酮含量变化及分布规律,对榆黄蘑的开发利用具有重要的指导意义,对其他的食用菌亦有一定的借鉴作用。

参考文献

- [1] 王玥玮,王麒麟,张立娟.榆黄蘑营养成分及其生物活性的研究进展[J].食品研究与开发,2017,38(4):201-203.
- [2] 王有兵,严毅,周庆宏.油橄榄研究进展[J].林业调查规划,2013,38(1):39-44.
- [3] 魏晶晶,张浩然,王志鸽,等.真菌金顶侧耳的研究进展[J].青海草业,2020,29(2):28-31.
- [4] 万鲁长,韩建东.榆黄蘑:金黄艳丽的蕈菌美食[J].解放军健康,2018(5):16-17.
- [5] 宫雪,张博,辛广,等.食用菌中黄酮类物质的研究进展[J].食品安全质量检测学报,2016,7(7):2821-2827.
- [6] 李永霞,韩俊杰,杨晓莉,等.金顶侧耳次级代谢产物及抗氧化活性研究(英文)[J].菌物学报,2013,32(5):876-882.
- [7] 杨志峰,朱英,李珊珊.植物黄酮的抗肿瘤作用及构效关系的研究进展[J].四川中医,2011,29(9):35-38.
- [8] GONZÁLEZ-GALLEGO J, SANCHEZ-CAMPOS S, TUÑÓN M J. Anti-inflammatory properties of dietary flavonoids[J]. Nutricion Hospitalaria, 2007, 22(3):287-293.
- [9] WINKEL-SHIRLEY B. Flavonoid biosynthesis. A colorful model for genetics, biochemistry, cell biology, and biotechnology[J]. Plant Physiology, 2001, 126(2):485-493.
- [10] ZHOU M, KONIGSBERG W H, HAO C H, et al. Bioactivity and mechanisms of flavonoids in decreasing insulin resistance. [J]. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2023, 38(1):2199-168.
- [11] BAG S, GHOSAL S, KARMAKAR S, et al. Uncovering the contrasting binding behavior of plant flavonoids fisetin and morin having subsidiary hydroxyl groups (-OH) with HRAS1 and HRAS2 i-Motif DNA structures: Decoding the structural alterations and positional influences[J]. ACS Omega, 2023, 8(33):30315-30329.
- [12] MOHAMMED H A, EMWAS A H, KHAN R A. Salt-tolerant plants, halophytes, as renewable natural resources for cancer prevention and treatment: Roles of phenolics and flavonoids in immunomodulation and suppression of oxidative stress towards cancer management[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2023, 24(6):5171.
- [13] 俞洁,邹永鹏.黄酮类化合物在动脉粥样硬化中的研究进展[J].心血管康复医学杂志,2024,33(3):347-350.
- [14] COMMENGES D, SCOTET V, JACQMIN-GADDA H, et al. Intake of flavonoids and risk of dementia[J]. European Journal of Epidemiology, 2000, 16(4):357-363.
- [15] 林启炫,杜灿凯,林稚凯,等.黄酮类化合物的生物活性及应用研究[J].现代食品,2024,30(2):92-97.
- [16] 缪钱江,刘宇,许峰,等.4种食用菌总黄酮生物功能的研究[J].食品科技,2014,39(7):206-209.
- [17] 刘月芹,贺晓龙,任桂梅.食用菌中黄酮类化合物的最新研究进展[J].贵州农业科学,2016,44(10):119-122.
- [18] 马陶陶,张群林,李俊.中药总黄酮的含量测定方法[J].安徽医药,2007(11):1030-1032.
- [19] 罗莹,张志军,周永斌,等.食用菌菌丝在不同谷物培养基上的生长研究[J].北方园艺,2020(13):124-128.
- [20] 巫桂芬,苏劲,梁剑柳,等.榆黄蘑菌丝生长条件优化[J].中国瓜菜,2023,36(10):112-120.
- [21] 温鲁.用谷物培养食用菌来生产功能食品[J].食品科学,2005,26(9):574-577.
- [22] 龙华,刘斌,李政东.9种常见野生食用菌总黄酮的提取鉴定分析[J].中国食用菌,2019,38(8):45-47.
- [23] 楚禄建,刘阳,朱单洁,等.超声法提取杏鲍菇菌糠总黄酮工艺[J].天津农业科学,2017,23(5):49-52.
- [24] 王晓波,何晓燕,王梅,等.火龙果皮总黄酮提取与体外抗氧化作用研究[J].食品工业科技,2011,32(11):156-159.
- [25] 杜庆鑫,魏艳秀,刘攀峰,等.分光光度法测定杜仲雄花和叶中的总黄酮[J].中南林业科技大学学报,2017,37(5):96-100.
- [26] 潘俊倩,佟曦然,郭宝林.光对植物黄酮类化合物的影响研究进展[J].中国中药杂志,2016,41(21):3897-3903.
- [27] 田云芳,曹婷婷,周明媚,等.黄瓜还阳参不同部位黄酮提取及抗氧化活性[J].北方园艺,2022(17):100-104.
- [28] 刘佳微,曹国璠,吴明开,等.贵茛1号不同部位中总酚、总黄酮、总多糖含量测定及其生物活性研究[J].中成药,2024,46(6):1968-1972.